



FONDAZIONE SIRM

Quesiti Clinici al Medico Radiologo : Fibrosi

Indicazione all'indagine/notizie cliniche:

Tecnica di acquisizione:

Artefatti da movimento (che limitano la valutazione): si/no

Precedenti TC per confronto (incluse precedenti TC addome): si/no. Se si: specificare

Segni di fibrosi: honey-combing: si/no

bronchiectasie/bronchiolectasie da trazione: si/no

segni di perdita di volume polmonare: si/no

ground glass con distorsione (fibrotico): si/no

estensione della fibrosi: %

Gradiente cranio-caudale delle alterazioni: si/no. Se si: Lobi superiori

Lobi inferiori

Distribuzione sul piano assiale: si/no. Se si: Subpleurica

Peribroncovascolare

Diffusa

Enfisema: si/no. Se si: Centrolobulare

Parasettale

>15% circa in estensione

Cisti: si/no

Perfusione a mosaico: si/no

Pattern delle tre densità si/no

Micronoduli: si/no

Estese opacità a vetro smerigliato: si/no

Consolidazioni si/no

Linfonodi ingranditi: si/no. Se si: ilari

mediastinici

ascellari

Incremento del calibro dell'arteria polmonare principale (diametro maggiore dell'aorta): si/no

PA > 30 mm si/no

P-A ratio > 0.9 si/no



FONDAZIONE SIRM

Versamento pleurico: si/no

Placche pleuriche suggestive di esposizione all'asbesto: si/no

Dilatazione dell'esofago: si/no

Pattern/conclusioni: UIP

UIP 'probabile'

Indeterminato per UIP

Suggestivo di altre diagnosi: (inserire possibili diagnosi differenziali)

NSIP

Sarcoidosi fibrosante

HP fibrosante

Asbestosi

Patologie del connettivo

Confidenza dell'ipotesi diagnostica radiologica: <50%

50-75%

>75%

Confronto con precedenti se disponibili: Nessuna modificazione

Quadro migliorato (estensione ridotta)

Incremento o modificazione (es. segni di fibrosi maggiormente evidenti) delle alterazioni